

LIPIEC - SIERPIEŃ - dobiega końca okres pylenia roślin o klinicznym znaczeniu dla osób alergicznych.

Z grupy o bardzo dużym i dużym zagrożeniu klinicznym pylić jeszcze będą babka, bylica i komosa, lecz stężenie pyłku tych roślin w okolicach Rabki raczej nie przekracza wartości średnich. Natomiast stężenie pyłku pokrzywy, należącej do grupy o średnim zagrożeniu klinicznym, w pierwszej połowie miesiąca może przekraczać wartości bardzo wysokie. Nadal dużej aktywności należy spodziewać się ze strony pleśni.

Babka - pyli wczesnym rankiem, zarówno w dni pochmurne jak i słoneczne.

Bylica - pyli stosunkowo długo w ciągu doby - pomiędzy godz. 8 a 16, a jej pyłek wywołuje reakcje kliniczne już przy stężeniu 12 jed.

Pokrzywa - jeden osobnik może wytworzyć około 100 tys. ziaren. W Rabce pylenie jest obfite, rozpoczyna się w pierwszych dniach maja i trwa do pierwszych dni września.

Komosa - najczęściej spotykana na poboczach dróg, rumowiskach, nad brzegami wód. Jeden osobnik może wytworzyć około 100 tys. ziaren. W Rabce pylenie rozpoczyna się w pierwszych dniach lipca i trwa do ostatnich dni września.

Zarodniki penicillium występują w Rabce przez cały rok, utrzymując w miarę wyrównane, średnie stężenie. Zarodniki cladosporium występują w Rabce przez cały rok. Od czerwca do końca listopada utrzymuje się stan wysoki.

Zarodniki alternarii występują pomiędzy 1 czerwca a 31 października, a średnie stężenie zarodników alternarii nie przekracza stopnia średniego (50jed.).